

INFO PRAIRIES – Cumuls des températures

Station de Lons-le-Saunier

26.03.2023 (repère 01.01) apport d'azote 200° : atteint le 10 février 2023

26.03.2023 (repère 01.02) : 391°

Station de Champagnole

26.03.2023 (repère 01.01) apport d'azote 200° : atteint le 23 février 2023

26.03.2023 (repère 01.02) : 264°

Station de Pontarlier

26.03.2023 (repère 01.01) apport d'azote 200° : atteint le 8 mars 2023

26.03.2023 (repère 01.02) : 249°

Station de La Pesse

26.03.2023 (repère 01.01) apport d'azote 200° : atteint le 22 mars 2023

26.03.2023 (repère 01.02) : 181°

Station de Saint-Julien-sur-Suran

26.03.2023 (repère 01.01) apport d'azote 200° : atteint le 18 février 2023

26.03.2023 (repère 01.02) : 321°

Repère des 200° sur la base du 1^{er} janvier (apports d'azote).

Pour rappel au niveau des autres repères de sommes de températures (repère 1^{er} février), on a un démarrage de la végétation vers 200-250°. Il faut prévoir la mise à l'herbe vers 300-350° et arrêter le déprimage avant 500°. Pic de croissance de l'herbe vers 650°. Enfin, le stade début épiaison (repère pour la date de fauche) pour les prairies à bonne productivité est de 800°, le stade foin début floraison à 1000° et le stade floraison à 1200°.

(Cumuls calculés à partir du 1^{er} janvier et 1^{er} février, base 0-18° C, à partir des températures moyennes journalières – Source : Météo France – Traitement chambre d'agriculture du Jura).

Renseignements : Sylvie Bombrun au 03-84-52-45-45 ou 07-87-05-44-84