



**Flash cultures n°22 - Mardi 29 Juin 2021**

Message élaboré par les techniciens de la Chambre d'Agriculture du Jura, structure agréée sous le numéro FC 00551 pour le conseil indépendant à l'utilisation des produits phytosanitaires.

Avec le soutien financier de :



**Quelques parcelles d'orge hiver ont été récoltées durant le week-end. Dommage que la pluie ait refait son apparition.**



***Photo 1 : Samedi 27 et Dimanche 28 juin, parcelle d'escourgeon récoltée, paille broyée et soja semé.***

## CEREALES D'HIVER

Les phénomènes de verse sont en augmentation.

### TOURNESOL

#### \* Stade :

Bouton étoilé de 1 à 7-8 cm, selon date de semis. La floraison est proche.

### SOJA

#### \* Stade :

La floraison débute dans les parcelles les plus précoces (semis de fin avril).

La nodulation est correcte dans les parcelles observées dans le réseau.



### MAÏS

#### \* Stade :

11 à 16 feuilles pour les semis d'avril. 8 feuilles pour les semis de juin.

#### \* Pyrale :

Les captures se poursuivent sur la parcelle d'Arlay seulement, avec 5 captures. Deux nouvelles parcelles piègent pour la première fois, Bois de Gand avec 1 capture et Ounans avec 2 captures. Toujours aucune capture sur les 2 parcelles qui se situent le plus au Nord, Gevry et Rochefort-Sur-Nenon. Voir tableau 1.

Aucune ponte n'a été observée ce jour. Sachant que c'est au stade « larve baladeuse » qu'il faut intervenir si l'on traite avec un produit chimique, il est donc encore trop tôt pour intervenir avec un insecticide. La période optimale pourrait avoir lieu à partir de la semaine prochaine et se terminer vers la mi-juillet. Conséquence, il faudra un matériel adapté type enjambeur, automoteur pour intervenir dans la plupart des parcelles à traiter. Voir bulletin de santé du végétal.

Tableau 1 : capture de pyrales dans piège à phéromone

Lieu	7/06	14/06	21/06	28/06	Captures cumu- lées
Vincelles	0	5	1	0	6
Arlay	0	1	7	5	13
Cosges	0	1	2	0	3
Saint-Lothain	0	1	0	0	1
Bois de Gand	0	0	0	1	1
Gevry	0	0	0	0	0
Ounans	0	0	0	2	2
Rochefort sur Nenon	0	0	0	0	0

### Rappel :

Rappel : Fréquemment on observe des pucerons mais aussi une faune auxiliaire pendant la période où les traitements insecticides sont réalisés. Il est important de préserver cette dernière pour qu'elle puisse faire son travail.

En conséquence, utilisez en priorité du CORAGEN à une dose comprise entre 0,1 et 0,125 L/ha et évitez tout insecticide liquide de la famille des pyréthri- noïdes (Cythrine Max, Ducat, Karate Technologie Zeon, Cyplan, Karakas, Fury 10 EW...).

Vous pouvez aussi utiliser un insecticide sous forme micro granulé tel que le Sherpa 2 GC à la dose de 15 kg/ha sous réserve de pouvoir disposer d'un ma- tériel adapté. Dans tous les cas de figure, laissez une bande égale à la longueur de la parcelle sur une lar- geur de rampe (ou 1/2) non traitée pour juger de l'intérêt ou non de votre traitement.