

Le froid arrive. Ce matin la glace est présente au fond des cuvettes. Sauf événement particulier, c'est le dernier flash cultures de l'année.

COLZA

Réalisez le plus **rapidement** possible **vos pesées entrées hiver** quelle que soit la grosseur du colza. Pour cela, coupez tous les pieds présents au niveau du collet sur un mètre linéaire ou sur un cadre d'1/4 de m². Répétez l'opération au moins 4 fois pour une bonne représentativité de la parcelle. Et enfin, calculez votre poids frais/m² (plante sèche). La quantité d'azote absorbé par kg de poids frais est de 65 N/ha, soit presque 200 N pour des colzas de 3 kg/m² ou 10 N/ha pour des colzas de 150 grammes/ha.

Le charançon du bourgeon terminal n'est plus capturé, excepté dans quelques situations à risque comme Petit-Noir (3) et Germigney (1). Le vol est terminé.



Ce n'est pas la première fois que l'on capture des rongeurs à l'aide de la cuvette jaune dans des parcelles en semis direct mais difficile d'estimer son efficacité.

Bien qu'il soit difficile de déterminer l'état des pucerons au champ (engourdis, morts), ils sont toujours aussi présents dans les parcelles sous les feuilles de colza, de quelques individus à plusieurs dizaines voire centaines. Comme depuis de nombreuses semaines, ils sont toujours présents en quantité dans les cuvettes (pucerons ailés). Nous n'avons pas observé de différences entre des colzas traités avec un insecticide et non traités. Les conditions trop froides de ce matin ne nous ont pas permis de mettre en évidence des efficacités de traitements insecticides réalisés la semaine dernière avec du Boravi WG ou du Karate K.

Lors des pesées colza réalisées sur une bonne vingtaine de parcelles, nous avons observé plusieurs fois de l'oïdium.

BLE TENDRE D'HIVER

* **Stade**: Semis à début tallage.

* **Désherbage** : Si votre parcelle n'est pas dés herbée, il faut la visiter quelque fois durant l'hiver pour savoir son degré de salissement en graminées. Si ce dernier est important, ne pas hésiter à agir dès que les conditions d'application seront réunies.

* **Pucerons**: Pas ou peu d'évolution par rapport aux semaines précédentes. Le froid devrait mettre un terme par rapport à la problématique pucerons.

Rappel du seuil d'intervention : 10 % et plus de plantes porteuses d'au moins 1 puceron. En dessous de ce seuil ne pas laisser séjourner les pucerons plus de 10 jours.

ORGE D'HIVER

* **Stade**: 1 feuille à début tallage.

* **Désherbage** : Voir blé.

* **Pucerons** : voir blé.



Semis d'orge de printemps le 19 novembre

Programme de la réunion technique céréales-oléagineux organisée par la Chambre d'agriculture du Jura le mercredi 5 décembre 2018 à Champdivers en partenariat avec Terres Inovia et Arvalis (9h-17h).

ACTUALITÉ SUR LES OLÉAGINEUX 8h45-12h30

- Tournesol
 - Résultats et choix de variétés pour 2019.
- Soja
 - Enseignements de la plateforme soja réalisé par le GVA de Chemin-dole (Comparatifs inoculum, écartements entre rangs et désherbage chimique et/ou mécanique).
- Colza
 - Intérêts et limites des semis très précoces.
 - Fertilisation azotée : Pertinence de la réglette pour les gros colzas entrée hiver. Enseignements du réseau de parcelles jurassien suivis en 2018.
 - Ravageurs colza :
 - pertinence de la grille de détermination du risque charançon du bourgeon terminal (CHBT),
 - charançon de la tige : toujours présent mais pas nuisible ?
 - traitements insecticides : de grands écarts entre les pratiques ? (Enseignements du réseau de plus de 70 parcelles jurassiennes)
- Remise des prix du concours « Lutter contre le CHBT, simple comme une pesée ».
- Apéritif

ACTUALITÉ SUR LES CÉRÉALES A PAILLE 14h15-17h

- Maladies des céréales (Blé Hiver, Orge Hiver - Escourgeon, Orge Printemps).
 - Bilan et évolution des résistances.
 - Résultats produits et programmes pour 2019.
 - Un nombre de traitements liés à la nuisibilité variétale (Enseignements de l'essai variétés x nombre de traitements).
- Fertilisation azotée : évaluation des nouveaux engrais azotés. Résultats nationaux et locaux.
- Fertilisation phosphatée : Est-elle nécessaire, quand l'apporter, localisée ou en plein ? Résultats nationaux et locaux.
- « Groupe 30000 » Quèsaco ?

Cette réunion est ouverte à tous les agriculteurs et agricultrices. En cas de repas, il est nécessaire de s'inscrire (Tel : 03-845-35-14-21).