



# a chronique **Ovine**

*Semaine 27 du 9 juillet 2021*

## Du sorgho fourrager en plante d'été



Dans la gamme des variétés de sorghos fourragers, certaines s'utilisent en mono coupe, d'autres en multi coupes. Elles diffèrent essentiellement par leur valeur énergétique et leur précocité. Certaines variétés sont dites "BMR" (à nervure centrale brune en anglais). Le gène BMR confère à la plante une plus faible teneur en lignine, ce qui induit une valeur alimentaire supérieure. Les variétés PPS pour "Photo Période Sensitive" (sensibles à la durée du jour) ont besoin de jours très longs pour épier. Elles conservent ainsi une valeur

alimentaire élevée plus longtemps. Une plateforme d'essais est actuellement implantée au CIIRPO, sur le site du Mourier, afin de mesurer les rendements et valeurs alimentaires de ces différentes variétés.

### En pâturage ou en enrubannage

Côté utilisation, ces sorghos peuvent à la fois être pâturés ou récoltés. Afin d'éviter tout risque de toxicité lié à leur teneur en acide cyanhydrique, les brebis doivent pâturer la plante lorsqu'elle dépasse 60 cm de hauteur. Le programme « Herbe et fourrages en Centre-Val de Loire » rappelle que la récolte doit s'effectuer avant le stade épiaison afin de garantir un bon niveau de valeur alimentaire. Elle peut être réalisée soit sous forme d'ensilage ou d'enrubannage, mais n'est pas envisageable en foin. Il est important de faucher haut (10 cm) afin de ne pas incorporer de terre et si possible avec une conditionneuse. Tout fanage est inutile. Le mieux est de ne pas toucher aux andains si la fenêtre météo est bonne et si la quantité de fourrages n'est pas trop élevée. Dans le cas contraire, il faut prévoir un andainage pour déplacer les andains, surtout en enrubannage pour gagner en matière sèche.

*Photo semaine 27-21 : la plateforme d'essai avec différentes variétés de sorgho et autres plantes d'été du CIIRPO (87)*

*CP : CIIRPO*

Equipe technique ovine de Bourgogne-Franche-Comté et Laurence Sagot (Institut de l'Élevage/CIIRPO)