



a chronique **Ovine**

Semaine 11 du 18 mars 2022

Du foin de trèfle violet pour réduire le coût de la ration des agneaux



Afin de diminuer le coût de la ration des agneaux en bergerie après le sevrage, il est possible de leur distribuer uniquement une céréale (associée à un complément minéral), avec un foin ou un enrubannage de trèfle violet semé pur.

Le fourrage de légumineuses est offert à volonté. L'azote est concentré dans les feuilles. Il est donc important de renouveler chaque jour le fourrage et d'enlever les refus constitués de tiges. La mise à disposition d'une botte entière à un lot d'agneaux est

déconseillée. La céréale est distribuée à volonté, ou bien rationnée à hauteur de 800 g à 1,2 kg par agneau et par jour selon leur sexe et leur poids.

Une diminution des croissances

Ces régimes entraînent toutefois une diminution des croissances des agneaux de l'ordre de 30% par rapport aux mélanges fermiers composés d'une céréale et d'un complémentaire azoté du commerce et du foin de graminées ou de la paille. Cette différence est la conséquence d'un apport azoté inférieur. La durée de finition des agneaux est ainsi majorée de 2 semaines en moyenne. Les quantités consommées en aliment sont inchangées. Par contre, celles de fourrages sont multipliées par 3 par rapport à un foin de graminées, refus compris. Les qualités de carcasse ne sont pas détériorées. Pour en savoir plus et connaître les alternatives possibles, une fiche technique est disponible sur idele.fr/ciirpo : « un foin ou de l'enrubannage de légumineuses pures pour finir les agneaux ».

Photo semaine 11-22 : l'enjeu est de conserver un maximum de feuilles à la récolte car l'azote y est concentré

CP : CIIRPO

Equipe technique ovine de Bourgogne-Franche-Comté et Laurence Sagot (Institut de l'Élevage/CIIRPO)